

Листок-вкладыш – информация для пациента**Анаферон детский, таблетки для рассасывания, 5 000 ЕМД**

Действующее вещество: антитела к гамма интерферону человека аффинно очищенные.

Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.

Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача, или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас или Вашего ребенка возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 3 дня Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Анаферон детский, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Анаферон детский.
3. Прием препарата Анаферон детский.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Анаферон детский.
6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения.

1. Что из себя представляет препарат Анаферон детский, и для чего его применяют

Препарат Анаферон детский, таблетки для рассасывания, относится к фармакотерапевтической группе «Иммуностимуляторы; другие иммуностимуляторы» (Средство для активации и поддержки иммунитета).

Показания к применению

Препарат Анаферон детский применяется для:

- профилактики и лечения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) у детей в возрасте от 1 месяца до 18 лет;
- лечения инфекций, вызванных герпесвирусами (инфекционный мононуклеоз, ветряная оспа), в составе комплексной терапии у детей в возрасте от 1 года до 18 лет;
- лечения острых кишечных инфекций, вызванных рота- и калицивирусами, в составе комплексной терапии у детей в возрасте от 6 месяцев до 18 лет.

Способ действия препарата Анаферон детский

Препарат Анаферон детский относится к биологическим лекарственным препаратам, полученным на основе градуальной технологии. При профилактическом и лечебном применении препарат оказывает иммуномодулирующее и противовирусное действие.

В ходе исследований установлено, что препарат Анаферон детский эффективен в отношении вирусов гриппа, парагриппа, риновируса, респираторно-синцитиального вируса, аденовируса, сезонных штаммов коронавирусов, метапневмовируса, бокавируса, герпесвирусов (ветряная оспа, инфекционный мононуклеоз), ротавируса, калицивируса.

Препарат снижает концентрацию вируса в пораженных тканях и стимулирует иммунный ответ.

Препарат обладает выраженным противовирусным действием – в 2 раза активнее борется с вирусами гриппа А и В по сравнению с плацебо. Через сутки от начала лечения позволяет существенно увеличить долю детей без повышения температуры, соответственно, уменьшая потребность в приеме жаропонижающих. С 3-го дня лечения значительно снижает тяжесть течения и сокращает длительность гриппа/ОРВИ, ускоряя выздоровление.

Профилактический прием в течение 12 недель снижает риск развития ОРВИ в 1,5 раза по сравнению с плацебо. Препарат имеет благоприятный профиль безопасности даже при длительном применении. В течение 4 недель профилактического применения не заболело более 99 % детей.

Если улучшение не наступило или Вы / Ваш ребенок чувствуете ухудшение через 3 дня, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата Анаферон детский

Противопоказания

Не применяйте препарат Анаферон детский:

- если у Вас или Вашего ребенка аллергия на действующее вещество или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Анаферон детский проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Дети и подростки

Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 1 месяца для профилактики и лечения гриппа и других ОРВИ, поскольку эффективность и безопасность применения препарата в данной возрастной группе не установлены.

Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 6 месяцев для лечения острых кишечных инфекций, вызванных рота- и калицивирусами, поскольку эффективность и безопасность применения препарата в данной возрастной группе не установлены.

Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 1 года для лечения инфекций, вызванных герпесвирусами (ветряная оспа, инфекционный мононуклеоз), поскольку эффективность и безопасность применения препарата в данной возрастной группе не установлены.

Другие препараты и препарат Анаферон детский

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы или Ваш ребенок принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Случаев несовместимости препарата Анаферон детский с другими лекарственными средствами до настоящего времени не зарегистрировано.

При необходимости препарат можно сочетать с другими противовирусными, антибактериальными и симптоматическими средствами.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Безопасность применения препарата Анаферон детский у беременных и в период грудного вскармливания не изучалась.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Анаферон детский не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат Анаферон детский содержит лактозу

Если лечащий врач сообщил, что у Вас / Вашего ребенка непереносимость некоторых сахаров, перед приемом данного лекарственного препарата обратитесь к лечащему врачу.

3. Прием препарата Анаферон детский

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Принимать препарат по 1 таблетке на прием.

ОРВИ, грипп

Детям от 1 месяца и старше.

В 1-й день лечения принимают 8 таблеток по следующей схеме:

по 1 таблетке каждые 30 минут в первые 2 часа (всего 5 таблеток за 2 часа), затем в течение этого же дня принимают еще по 1 таблетке 3 раза через равные промежутки времени. На 2-ой день и далее принимают по 1 таблетке 3 раза в день до полного выздоровления.

С профилактической целью препарат принимают по 1 таблетке 1 раз в день в течение 1-3 месяцев.

Острые кишечные инфекции, вызванные рота- и калицивирусами, в составе комплексной терапии

Детям от 6 месяцев и старше.

В 1-й день лечения принимают 8 таблеток по следующей схеме:

по 1 таблетке каждые 30 минут в первые 2 часа (всего 5 таблеток за 2 часа), затем в течение этого же дня принимают еще по 1 таблетке 3 раза через равные промежутки времени. На 2-ой день и далее принимают по 1 таблетке 3 раза в день до полного выздоровления.

Лечение инфекций, вызванных герпесвирусами (ветряная оспа, инфекционный мононуклеоз), в составе комплексной терапии

Детям от 1 года и старше.

В 1-й день лечения принимают 8 таблеток по следующей схеме:

по 1 таблетке каждые 30 минут в первые 2 часа (всего 5 таблеток за 2 часа), затем в течение этого же дня принимают еще по 1 таблетке 3 раза через равные промежутки времени. На 2-ой день и далее принимают по 1 таблетке 3 раза в день. Продолжительность лечения ветряной оспы составляет 7 дней. Продолжительность лечения инфекционного мононуклеоза составляет 14 дней.

Путь и (или) способ введения

Препарат Анаферон детский предназначен для приема внутрь. Таблетку держать во рту до полного растворения. Не принимать во время приема пищи. Линия разлома (риска) не предназначена для деления таблетки.

При применении препарата у детей младшего возраста (от 1 месяца до 3 лет) рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве (1 столовая ложка) кипяченой воды комнатной температуры.

Продолжительность терапии

Длительность лечения при ОРВИ, гриппе, продолжается до полного выздоровления; длительность профилактического курса – 1-3 месяца.

Длительность лечения при острых кишечных инфекциях, вызванных рота- и калицивирусами, продолжается до полного выздоровления.

Длительность лечения при ветряной оспе составляет 7 дней; при инфекционном мононуклеозе – 14 дней.

Если Вы приняли препарата Анаферон детский больше, чем следовало

При передозировке возможны диспепсические явления (расстройство пищеварения), обусловленные входящими в состав препарата вспомогательными веществами.

Если Вы забыли принять препарат Анаферон детский

Если Вы или Ваш ребенок пропустили прием препарата Анаферон детский, следует принять следующую дозу сразу, как только Вы об этом вспомнили, а следующую после этого приема очередную дозу следует принять в обычное время. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Частота неизвестна – на основании имеющихся данных оценить невозможно:

- аллергические реакции и проявления повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас или Вашего ребенка возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения.

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1.

Тел.: + 7 800 550 99 03.

E-mail: pharm@roszdravnadzor.gov.ru или npr@roszdravnadzor.gov.ru

<https://www.roszdravnadzor.gov.ru/>

Кыргызская Республика.

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики.

Адрес: 720044, г. Бишкек, ул. 3-я линия, 25.

Тел.: 0800 800 26 26.

E-mail: pharm@dlsmi.kg

<https://www.dlsmi.kg>

Республика Армения.

«Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий» ГНКО.

Адрес: 0051, г. Ереван, пр. Комитаса, 49/5.

Тел.: + 374 10 20 05 05; + 374 96 22 05 05.

Е-mail: admin@pharm.am

<http://www.pharm.am>

Республика Казахстан.

РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК.

Адрес: 010000, г. Астана, ул. А. Иманова, 13.

Тел.: + 7 7172 23 51 35.

Е-mail: pdlc@dari.kz

<https://www.ndda.kz>

Республика Беларусь.

РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении».

Адрес: 220037, г. Минск, пер. Товарищеский, 2а.

Тел.: + 375 17 242 00 29.

Е-mail: rcpl@rceth.by

<https://www.rceth.by>

5. Хранение препарата Анаферон детский

Храните лекарственный препарат в недоступном для детей месте.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке, после слов «Годен до».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Хранить при температуре не выше 25 °С.

В течение периода применения препарата хранить контурную ячейковую упаковку в картонной пачке, предусмотренной производителем.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и дополнительные сведения

Препарат Анаферон детский содержит

Действующим веществом являются антитела к гамма интерферону человека аффинно очищенные.

Каждая таблетка содержит 5 000 ЕМД* антител к гамма интерферону человека аффинно очищенных.

Прочими ингредиентами (вспомогательными веществами) являются лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.

* ЕМД – единицы модифицирующего действия.

Препарат Анаферон детский содержит лактозу (см. раздел 2).

Внешний вид препарата Анаферон детский и содержимое упаковки

Таблетки для рассасывания.

Таблетки плоскоцилиндрической формы, с риской и фаской, от белого до почти белого цвета. На плоской стороне с риской нанесена надпись MATERIA MEDICA, на другой плоской стороне нанесена надпись ANAFERON KID.

По 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. По 1 контурной ячейковой упаковке вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация.

ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»;

127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер., д. 9.

Тел./факс: + 7 495 684 43 33.

Тел. «Горячей линии»: + 7 495 681 09 30, + 7 495 681 93 00.

E-mail: hotline@materiamedica.ru

Производитель

Российская Федерация.

ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»;

454139, г. Челябинск, ул. Бугурусланская, д. 54.

За любой информацией о препарате следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения.

Российская Федерация.

ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»;

Тел./факс: + 7 495 684 43 33.

Тел. «Горячей линии»: + 7 495 681 09 30, + 7 495 681 93 00.

E-mail: hotline@materiamedica.ru

Кыргызская Республика.

Представительство ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»;

Тел.: + 996 312 88 24 92.

E-mail: kg@materiamedica.ru

Республика Армения.

ООО «Сиа-фарм»;

Тел.: + 374 10 53 06 53.

E-mail: hotline@materiamedica.ru

Республика Казахстан.

Представительство ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»;

Тел./факс: + 727 273 47 13.

E-mail: kz@dep.materiamedica.ru

Республика Беларусь.

Представительство ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»;

Тел./факс: + 375 17 323 58 68.

E-mail: bel@dep.materiamedica.ru

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза.